

HYBRIDER FUNDET I SIKKIM 1994 (Danish expedition)

af Hans Eiberg

| Fænotype blomst | Krydsning (mor x far) | Kendetegn (far)= egenskaben fra faderen |
|--------------------------------|--|--|
| hodgsonii kr brunt indument | hodgsonii x falconerii/omv? (hodgsonii x campanulatum?) (R.decipliens) | Indument m brunt tykt (far) Lange blade. Ligner mest hodgsonii Nervet blad? |
| Lyserøde thomsonii | thomsonii x campylocarpum (N Sikkim) (R.thomsonii v candelabrum) | Blomsterfarve, calyxmidt mellem foræld. Frøplanter kirtelfarve lysere (far) Nogle planter med grenede randhår (far) Vokser mellem forældrene. Blade længere end thomsonii. Frøhus med kirtler? |
| Gul thomsonii | F2 af ovenstående (N Sikkim) | Blomsterfarve, calyx m lille (far) Dårligt pollen + få frø Vokser mellem forældrene |
| "decipiens" rød wightii | wightii x hodgsonii (N Sikkim) | Vokser mellem forældrene Kronblade antal = mellemting (6-7) Indument mellemting = lys brunt Klistrede knopper (wightii) |
| "decipiens" l rød wightii | hodgsonii x wightii (N og W Sikkim) | " " (støvdrager antal = mellemting 12,14) |
| "wightii" | wightii x hodgsonii(thomsonii) | indument, calyx?, 5 kronblade! |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| ferskenfarvet" "? decipiens" | (W Sikkim) Evt naturlig variation af R.wightii ? | Vokser ved forældrene, Vokser mellem forældrene |
| - blomst | wightii x campanulatum (N Sikkim) | Klistrede (mor) aflange knopper (far) Indument mellemting Vokser mellem forældrene |
| - blomst | wightii x campylocarpum?/? (N Sikkim) | Ingen indument (far) Aflange blade uden børster Ligner mest campylocarpum Vokser mellem forældrene |
| Lyserød falconerii (R. decipiens) | hodgsonii x falconerii /omv (W Sikkim) | Farve mellemting |
| Lyserød barbatum | variant ? (W Sikkim) | |
| smithii | variat af barbatum (W Sikkim) | Mange hår på undersiden af bladene |
| hodgsonii | naturlig variation | Sorte knopper/grønne knopper |
| barbatum | naturlig variation | ±børster på bladstilke mm. |